

Le Chevreuil

Sa carte d'identité:

De la famille des cervidés



Nom scientifique:

Capreolus capreolus

Couleur:

Pelage roux en été, brun-gris et plus épais en hiver

Poids:

18 à 25 kg

Hauteur au garrot:

60 à 80 cm

Longueur:

95 à 135 cm

Alimentation:

Herbivore ruminant

Durée de vie:

Jusqu'à 6 ans

Portée:

1 à 2 petits par année

Mise bas:

Entre mai et juillet

Habitat

Le chevreuil se plaît dans les forêts de feuillus avec une végétation étagée. Il vit en plaine et à moyenne altitude dans divers milieux forestiers. Au pied des grands arbres, les arbustes et autres plantes herbacées constituent son garde-manger. On le trouve généralement en lisière et il apprécie la présence de pâturages et de clairières.

Biologie

Le rut a lieu pendant les mois de juillet et août. Durant cette période, le mâle, le brocard, devient très agressif envers les autres mâles et, parfois, se bat. Il est généralement fidèle à une seule chevrette et ne constitue pas de harde.

Le chevreuil est un animal semi-gregaire et vit généralement en petits groupes. Pendant les périodes de gagnage, plusieurs familles peuvent se rapprocher, mais se séparent dès qu'elles retournent se réfugier en forêt.

Dégâts

Les chevreuils sont responsables de certaines déprédations en forêt. L'abroustissement constitue le dégât le plus répandu. Ils mangent les jeunes pousses d'arbres et les bourgeons, ceci notamment en hiver, lorsque la végétation herbacée se fait rare. Ils se nourrissent aussi de l'écorce des arbres et s'y frottent pour marquer leur territoire durant la période de reproduction.

Abroustissement: la mâchoire supérieure étant dépourvue d'incisives, le rameau semble avoir été arraché ou brisé (illustration)

Frottis: les chevreuils marquent leur territoire en frottant leurs bois contre les arbres (illustration)

Empreintes

Petites, étroites et allongées, environ 4 – 5 cm, tournées vers l'intérieur, sans marque des os.



Attention aux petits faons

La mise bas a lieu entre mai et juillet. Généralement, elle se déroule dans un champ d'herbe. Dans la plupart des cas, les petits restent couchés dans la végétation environ 2 semaines et ne se déplacent qu'en présence de leur mère. La fauche des prairies peut être fatale pour les jeunes faons. C'est pourquoi une recherche préalable à la fauche est fortement souhaitée.

RAIFFEISEN

