



le sanglier



Sa carte d'identité:

De la famille des suidés

**Nom scientifique:**

Sus scrofa

Cousin:

Le cochon domestique

Couleur:

Du gris au noir
en passant par le brun

Poids:

Mâle, jusqu'à 150 kg
Laie, jusqu'à 90 kg

Alimentation:

Omnivore

Portée:

De 4 à 8 jeunes

Période de protection:

Du 1^{er} février
au 30 juin

Nourriture

Le sanglier est omnivore. La nourriture végétale est prédominante. En forêt il mange principalement des glands, des faines, des racines et des graminées. La partie carnivore de son régime alimentaire est composée de larves d'insectes, de petits vertébrés ou de la charogne. Dans les zones de cultures, il se nourrit de maïs ou de céréales.

Habitat

Le sanglier vit surtout dans les forêts mixtes et les roselières. Il a tendance à habiter près des zones de cultures car il y trouve des refuges et de la nourriture en abondance.



Dégâts

Le sanglier croque les épis de maïs sur la partie supérieure ou les sectionne. Seuls 30% des épis à terre sont consommés. Il casse les tiges à une dizaine de centimètres du sol ou se roule dessus.

Il se nourrit aussi de vers qu'il trouve en « labourant » les prairies.

Pour se protéger, les agriculteurs évitent de planter du maïs trop près de la bordure des forêts.

Après le labourage, attendre quelques jours avant de semer. L'odeur de la terre fraîchement retournée l'attire.

Il est aussi conseillé de protéger les parcelles, dès le semis, avec une clôture électrique.

Biologie

A l'exception des vieux mâles, le sanglier est une espèce sociable. Le groupe familial, composé de la laie et de sa progéniture est la plus petite unité sociale.

Entre 10 et 12 mois, les jeunes mâles sont chassés du groupe par la mère. Les femelles restent auprès de la mère et forment une compagnie.

Les sangliers peuvent être distingués selon leur âge. De 0 à 4 mois c'est un marcassin, de 4 à 12 mois une bête rousse, de 12 à 24 mois une bête de compagnie puis de 2 à 3 ans un ragot.

Le rut principal a lieu de décembre à février. La mise-bas de mars à juin. La gestation dure en moyenne 115 jours et l'allaitement de 3 à 4 mois.

La laie meneuse sécrète des phéromones qui stimulent les autres femelles de la compagnie qui entrent également en chaleur.

Empreintes



Sabots souvent suivis de deux autres doigts postérieurs (gardes) bien marqués latéralement.

RAIFFEISEN

