

le blaireau

Sa carte d'identité:

De la famille des mustélidés



Nom scientifique:
Meles meles

Cousin:
Martre, belette, putois
et fouine

Couleur:
Gris sur le dos, noir sur
le ventre. Tête ornée de
bandes noires et blanches.

Poids:
Jusqu'à 16 Kg

Durée de vie :
4 ans en moyenne

Cycle d'activité :
Nocturne

Portée:
3 petits
en moyenne

**Période
de protection:**
Du 16 janvier
au 15 juin

Habitat

Le blaireau vit dans des tanières situées dans les forêts ou dans les haies. Il possède plusieurs tanières, certaines pour la mise-bas et l'hivernage, d'autres pour le repos diurne.

Biologie

Le rut dure de février jusqu'en mars. L'implantation de l'ovule fécondé est différée jusqu'en décembre et janvier.

Une portée compte en moyenne 3 jeunes qui sont allaités pendant environ 12 semaines.

La première sortie à l'air libre des petits a lieu autour de l'âge de 8 semaines.

Nourriture

Le blaireau se nourrit principalement de lombrics ou de larves d'insectes enfouies dans le sol. Il consomme aussi des escargots, de petits vertébrés comme les rongeurs, les hérissons et les amphibiens. Selon la saison, il peut aussi s'alimenter de fruits, de baies ou de végétaux trouvés dans les cultures agricoles comme le maïs ou les céréales. Il est méticuleux et systématique. Tous les épis à terre sont consommés.



Empreintes

Elles sont constituées de 5 doigts terminés par des griffes. Les griffes des pieds antérieurs sont très longues; elles sont utilisées pour le fouissage (creuser la terre).

Dégâts

Le blaireau jouit d'une mauvaise réputation. Il est parfois responsable de dégâts dans les champs de maïs et de céréales. Il détruit les pelouses pour manger les larves de hannetons. Il creuse de petits trous coniques qui sont ses latrines pour y déposer ses crottes

RAIFFEISEN



**LOTÉRIE
ROMANDE**